Lambrusque Sejnene 1



8500MTP31



Collection Vassal-Montpellier

Vass2R08s301-305 8500Mtp31

Vass2R08s301-30

8500Mtp31

Lambrusque Sejnene 1 Vass2R08s301-305

4 AOUT 2003

T. RIND

T. LA COTTER

Formulaire de description 1/8

(stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année: 2005

Observateur:

Code cépage :

Code introduction: 8500Mtp31

Nom introduction : Lambrusque Sejnene 1

Emplacement: Vass2R08s301-305

Phénologie

oiv 301 époque du bourgeonnement (50%) : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 302 époque de floraison (50%): très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 303 époque de véraison : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 304 maturité physiologique de la baie : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 305 début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base) : très précoce 1 - précoce 3 - moyen 5 - tardif 7 - très tardif 9.

oiv 306 coloration des feuilles en automne : jaune 1 - rougeâtre 2 - rouge 3 - rouge foncé 4 - rouge violet 5.

Vigueur et croissance

oiv 351 vigueur rameaux (floraison): très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9. oiv 352 croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité): très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 459 résistance Botrytis grappe: très faible ou faible 3 - moyenne 5 - élevée ou très élevée 9.

Vassal:

| Souche | Nombre de bourgeons | Date de début | débourrement moitié (oiv 301) | Nbre grappes (oiv 153) | Fertilité (grappes/10 yeux) |
|---------|------------------------|------------------|----------------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| 1 | 3 | 05/04 | 12/04 | 4 | |
| 2 | pla | | | \ | |
| 3 | Als | | | \ | |
| 4 | 4 | 05/04 | 10/04 | 2 | |
| 5 | 4 | | 12/04 | 3 | |
| Moyenne | 11 | | 11/4 | 9 | 8 |

+9

| Date de début | floraison moitié (oiv 302) | Taux de nouaison % (oiv 501) | Date de début | véraison moitié (oiv 303) | Date de maturité (oiv 304) | Début aoûtement (oiv 306) |
|------------------|----------------------------------|------------------------------------|------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| 30/5 | 2/6 | | 19/08 | 30/08 (+5) | 12/9,3 | V |

9 Aprilian

litery for yourse Hi

18/3 I'2 22, b. party A. 22/3 IR = 30 Pas de font A

I.N.R.A. - Domaine de Vassal - version 2003

Formulaire de description 1/8

(stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année: 2006

≥:2006

Observateur:

Code cépage: 8500Mtp31

Code introduction: 8500Mtp31

Nom introduction : Lambrusque Sejnene 1

Emplacement: Vass2R08s301-305

Phénologie

oiv 301 époque du bourgeonnement (50%) : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 302 époque de floraison (50%): très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 303 époque de véraison : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9. oiv 304 maturité physiologique de la baie : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 305 début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base) : très précoce 1 - précoce 3 - moyen 5 - tardif 7 - très tardif 9.

oiv 306 coloration des feuilles en automne : jaune 1 - rougeâtre 2 - rouge 3 - rouge foncé 4 - rouge violet 5.

Vigueur et croissance

oiv 351 vigueur rameaux (floraison): très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9. oiv 352 croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité): très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 459 résistance Botrytis grappe : très faible ou faible 3 - moyenne 5 - élevée ou très élevée 9.

Vassal:

| Souche | Nombre de bourgeons | Date de début | débourrement moitié (oiv 301) | Nbre grappes (oiv 153) | Fertilité (grappes/10 yeux) |
|---------|------------------------|------------------|----------------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| 1 | 5 | 21/3 | 214 280p dib 31/3 | 14 8 | |
| 2 | | 1 | | 1 | |
| 3 | | 1 | 1 | X | |
| 4 | 2 | Bry gogle 23/3 | 29/3 | 1 200 | |
| 5 | 2 | \ | 23/3 | 30 | |
| Moyenne | 9 | 16 | 28/3 | 18 | 20 |
| | | 1 | +1 | | - |

Date de floraison Taux de Date de véraison Date de Début début moitié nouaison début moitié maturité aoûtement (oiv 302) % (oiv 501) (oiv 303) (oiv 304) (oiv 306)

+ =

a naturdia le 16/8

6/0 per the Pait vor

st. lexo

I.N.R.A. - Domaine de Vassal - version 2003

Coul = Rg
pejin : 0
Sac : 11

Formulaire de description 1 / 8

(stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année: 2007

sexe: H

Observateur:

Code cépage: 8500Mtp31

Code introduction:

Nom introduction: Lambrusque Sejnene 1

Emplacement: Vass2R08s301-305

Phénologie

oiv 301 époque du bourgeonnement (50%) : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 302 époque de floraison (50%): très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 303 époque de véraison : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9. oiv 304 maturité physiologique de la baie : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 305 début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base) : très précoce 1 - précoce 3 - moyen 5 - tardif 7 - très tardif 9.

oiv 306 coloration des feuilles en automne : jaune 1 - rougeâtre 2 - rouge 3 - rouge foncé 4 - rouge violet 5.

Vigueur et croissance

oiv 351 vigueur rameaux (floraison): très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9. oiv 352 croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité): très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 459 résistance Botrytis grappe: très faible ou faible 3 - moyenne 5 - élevée ou très élevée 9.

Vassal:

| Souche | Nombre de bourgeons | Date de début | débourrement moitié (oiv 301) | Nbre grappes (oiv 153) | Fertilité (grappes/10 yeux) |
|---------|------------------------|------------------|----------------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| . 1 | 5 | 15/3 | 5213 | O manos | sur bejoure |
| 2 | 12 | 0 1 | | | 1 |
| 3 | 2 | | | | |
| 4 | 12 | | | | |
| 5 | 12 | | 12/3 | O Marchillo | 1 |
| Moyenne | 5 | | 17/3 | 0 1 | Ofen |

+ 8

| Date de début | floraison moitié (oiv 302) | Taux de nouaison % (oiv 501) | Date de début | véraison moitié (oiv 303) | Date de maturité (oiv 304) | Début aoûtement (oiv 306) |
|------------------|----------------------------------|------------------------------------|------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| .the | 25/5 | 0%. | | | | |

+6 1 Baic nouée (m le 26/6)

Voir coul;

I.N.R.A. - Domaine de Vassal - version 2003

9

rice to mouse

*

Formulaire de description 1/8

(stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

JPP

Année: 2013

Observateur:

CodeVar: 8501

8501 CodeIntro: 8500Mtp31

Nom Var : Lambrusque Sejnene 1

Emplacement: Vass2R08s301-305

| | PHENOLOGIE | | | | | | | | | | | |
|------------|---|--------------|-----------|---------|----------------|-----------------|--|--|--|--|--|--|
| Code | Descripteur | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | | | | | | |
| Oiv 301 | époque du bourgeonnement | très précoce | précoce | Moyenne | tardive | très tardive | | | | | | |
| Oiv 302 | époque de floraison | très précoce | précoce | Moyenne | tardive | très tardive | | | | | | |
| Oiv 303 | époque de véraison | très précoce | précoce | Moyenne | tardive | très tardive | | | | | | |
| Oiv 304 | maturité physiologique de la baie | très précoce | précoce | Moyenne | tardive | très tardive | | | | | | |
| Oiv 305 | début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base) | très précoce | précoce | Moyenne | tardive | très tardive | | | | | | |
| Oiv 306 | coloration des feuilles en automne | Jaune | Rougeâtre | Rouge | Rouge foncé | rouge violet | | | | | | |

VIGUEUR ET CROISSANCE

| | vigueur rameaux (floraison) | très faible. | Faible | Moyenne | Forte | Très forte |
|---------|---|---------------------------|--------|---------|-------|------------|
| Oiv 352 | croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité) | absent ou très faible. | Faible | Moyenne | Forte | Très forte |

RESISTANCE

| Oiv 459 | Degré de résistance Botrytis grappe | très fa fai | ble ou moyenne | élevée ou très élevée |
|---------|-------------------------------------|----------------|----------------|--------------------------|
| | | | | |

| Souche | Nombre de bourgeons | Date de début | débourrement moitié (oiv 301) | Nbre grappes (oiv 153) /6/5 | Fertilité (grappes/10 yeux) |
|-------------|---------------------|------------------|----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| Taille (pue | 12 casbanua | 23/3 | 2013 (Marie our 20524 | 29 dlb = Ahaml 29/1) | |
| 2 ' | 2 | | 24/3 | 2 | |
| 3 | 4 | | 2313 | S | |
| 4 | 3, | | 26/3 | 0 | |
| Teillo Law | or d. Carbanneau | 30%-60 | 31/3 613 produ 120 2913 bode | 214 21 | |
| Moyenne | ٠ ود | | 27/3 +3 | 57 | 20 |

| | Date ébut | floraison moitié (oiv 302) | Taux de nouaison % (oiv 501) | Date de début | véraison moitié (oiv 303) | Date de maturité (oiv 304) | Début aoûtement (oiv 306) |
|----|--------------|----------------------------------|------------------------------------|------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| 03 | 106 | 06.06 | | 19108 Conflora | 2109 46 | 30.09 +3 | |

SUIVI DE MATURITE

| SULVIDEMAT | URITE | | | | |
|---------------------|-------|-------|-------|-------|--------------------------|
| Dates | 30.08 | 02/09 | 12.09 | 16.09 | 20.09 |
| IR | verte | idem | AS | 21 | enesse 1 pen acide |
| Valeur papier PH | 25.09 | | | | - 44 E-1-CM |

Remarque:

acide Apr

Formulaire de description 2 / 8

(stade floraison)

Année: 2006 Observateur:

Code cépage: Code introduction: 8500Mtp31

Nom introduction: Lambrusque Sejnene 1 Emplacement Vass2R08s301-305

Bourgeonnement

oiv 001 forme: globuleuse 3 - demi-ouverte 5 - ouverte 7

oiv 002 distribution pigmentation anthocyanique: absente P- en liseré 2 - partout 3.

oiv 003 intensité pigmentation anthocyanique : nulle ou très faible 3 - moyenne 5 -

forte 7 - très forte 9.

oiv 004 densité poils couchés : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9. oiv 005 densité poils dressés : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

Jeunes feuilles

oiv 051 couleur face supérieure (4° feuille détachée) : verte 1 - jaune 2 - plages bronzées 3-cuivrées rougeâtre sur toute la surface 4.

oiv 053 densité poils couchés entre nervures (face inf. 4° feuille) : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 054 densité poils dressés entre nervures (face inf. 4° feuille) : nulle ou très faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 055 densité poils couchés sur nervures (face inf. 4° feuille) : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 🕏 - forte 7 - très forte 9.

oiv 056 densité poils dressés sur nervures (face inf. 4° feuille) : nulle ou très faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

Vassal:

Jeunes feuilles du haut (3 premières détachées)

Profil: étalées 1 - en gouttière 2) - autre 3.

Densité poils couchés face inf. :nulle ou très faible 299 - faible 202 – moyenne 203 - très forte 204

Densité poils dressés face inf. : nulle ou très faible 280 - moyenne 200 - très forte 201.

Densité poils couchés face sup. : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

Densité poils dressés face sup. : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

Couleur face sup.: blanc 205 - fauve roux 206 - carminé 207 - liseré carminé 208 - jaune 209 - plages bronzées ou cuivrées 210 - vertes 212 - autre 213.

(Dans le cas où la 1° feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° feuille détachée sera notée :)

Jeunes feuilles du bas (3 suivantes)

Profil: plan 1)- en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

Densité poils couchés face inf. : nulle ou très faible 285 - faible 223 - moyenne 224 - très forte 225.

Densité poils dressés face inf. : nulle ou très faible 284- moyenne 215 - très forte 216.

Densité poils couchés nervures face inf. : nulle ou très faible 283 - faible 217 - moyenne 218 -

Densité poils dressés nervures face inf. : nulle ou très faible 282 - moyenne 215 - très forte 216.

Densité poils couchés face sup. : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

Densité poils dressés face sup. : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

Couleur face sup. : blanc 226 - fauve roux 227 - carminé 228 - liseré carminé 229 - jaune 230 -

plages bronzées ou cuivrées 231 - entièrement bronzées ou cuivrées 232 - vertes 233.

Formulaire de description 3/8 (stade floraison)

Année: 2006

Observateur: TO

Code cépage :

Code introduction: 8500Mtp31

Nom introduction: Lambrusque Sejnene 1 Emplacement: Vass2R08s301-305

Rameau herbacé

oiv 006 port : érigé 1 - demi-érigé(3)- horizontal 5 - demi-retombant 7 - retombant 9. oiv 351 vigueur rameaux : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 007 couleur face dorsale entrenoeuds: verte 1 - verte à raies rouges 2 - rouge 30

oiv 009 couleur face dorsale nocuds: verte 1 - verte à raies rouges 20- rouge 3.

ois 008 couleur face ventrale entrenoeuds : verte à raies rouges 2 - rouge 3.

oiv 010 couleur face ventrale noeuds : verte 1 - verte à raies rouges 2 - rouge 3.

oiv 014 densité poils couchés entrenoeuds : nulle ou très faible 1 - moyenne 5 - forte 9.

oiv 012 densité poils dressés entrenoeuds : absence 1 - présence 9.

oiv 013 densité poils couchés noeuds : nulle ou très faible P- moyenne 5 - forte 9.

oiv 011 densité poils dressés noeuds : absence (1) - présence 9.

oiv 015 pigmentation anthocyanique écailles des bourgeons : nulle ou très faible 1 - faible 3 moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 016 distribution vrilles: discontinue (2 ou moins) 12- subcontinue ou continue (3 ou plus) 2. oiv 017 longueur vrilles: très courtes (<10cm) 1 - courtes (15cm) 3 - moyennes (20cm) 5)- longues (25cm) 7 - très longues (>30cm) 9.

Inflorescence

oiv 151 sexe de la fleur : mâle 1 - mâle à hermaphrodite 2 - hermaphrodite 3 - femelle à étamines érigées 4 - femelle à étamines reflexes 5.

oiv 152 niveau insertion 1° inflorescence : jusqu'au 4° noeud 1 - au-delà du 4° noeud 2.

oiv 153 nombre inflorescence/rameau: 1 ou moins 1 - 1,1 à deux 2 - 2,2 à trois 3 - plus de trois 4. oiv 155 inflorescence sur rameaux issus des 3 yeux de la base : absence 1 – présence 9.

oiv 501 taux de nouaison (7 à 14 j après floraison) : très faible (<10%) 1 - faible (11-30%) 3 moyen (31-50%) 5 - élevé (51-70%) 7 - très élevé (>80%) 9.

Vassal:

Syrface du rameau herbacé : unie 1 - côtelée (2)

000-10 Villosité spéciale du rameau herbacé : épines ou analogues 1 - poils massifs 2 -aucune 3.

000-21 Couleur des vrilles : jaune 1 – rouge clair 2 – rouge foncé 3 – vert 4)

Bouton floral: petit 1 – moyen 2 – gros 3.

Formulaire de description 4/8

(entre stades nouaison et véraison)

Année: 2006 Observateur: TD Code introduction: 8500Mtp31 Code cépage: Nom introduction: Lambrusque Seinene 1 Emplacement: Vass2R08s301-305

Feuille adulte

oiv 065 taille: très petite 1 - petite 3 - moyenne 5 - grande 7 - très grande 9.

oiv 067 forme du limbe : cordiforme 1 - cunéiforme 2 - pentagonale 3 - orbiculaire 4 - réniforme 5.

oiv 068 nombre de lobes : feuille entière 1 - trois 2 - cinq 3 - sept 4 - plus de sept 5

oiv 069 couleur face supérieure limbe : vert clair 3 - vert moyen 5 - vert foncé 72

oiv 070 pigmentation anthocyanique des nervures, face supérieure : nulle 1 - point pétiolaire

rouge 27 rouge jusque première bifurcation 3 - rouge après première bifurcation 4.

oiv 071 pigmentation anthocyanique nervures, face inférieure : nulle 1 - point pétiolaire rouge/20

- rouge jusque première bifurcation 3 - rouge après première bifurcation 4.

oiv 074 profil : plan 1)- en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

oiv 073 ondulation limbe (entre nervures I ou II) : absente 1 - présente 9.

oiv 072 gaufrure limbe (dépressions entre nervures II ou III) : absente 1 - présente 9.

oiv 075 cloqure face supérieure limbe (relief entre nervures de dernier ordre) :

nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 084 densité poils couchés entre nervures face inférieure :

nulle ou très faible V - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 085 densité poils dressés entre nervures face inférieure :

nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 086 densité poils couchés des nervures face inférieure :

nulle ou très faible (1)- faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 087 densité poils dressés des nervures face inférieure :

nulle ou très faible 1/2 faible 1/3/2 moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 088 villosité couchée des nervures principales face supérieure : absente 1 présente 9.

oiv 089 villosité dressée des nervures principales face supérieure : absente 1 - présente 9.

Pétiole

oiv 090 densité poils couchés : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9

oiv 091 densité poils dressés : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 093 longueur du pétiole p/r nervure médiane :

beaucoup plus court 1 - plus court 3 - égal 5 - plus long 7 - beaucoup plus long 9.

Autre

oiv 501 taux de nouaison (7 à 14 j après floraison) : très faible (<10%) 1 - faible (11-30%) 3 moyen (31-50%) 5 - élevé (51-70%) 7 - très élevé (>80%) 9.

Densité poils couchés limbe face supérieure : Vassal:

nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

Densité poils dressés limbe face supérieure :

nulle ou très faible (1) - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9. oiv 000-06 Couleur du pétiole : vert 3 - partiellement coloré 2 - coloré(1)

[sinus pétiolaire : ouverture = 1-2-3-4-5-6 / forme = U-accol.-V / dent = oui-non / dégarni = non-parfois-oui]

sinus latéraux : ouverture = 1-2-3-4 / forme = U-accol.-V / dent = ofi-non]

[dents: forme = concave-rectiligne-rectiligne&ronde-ronde-crochue / taille = 1-3 (5-7-9 / courtes-moy-longues]

Formulaire de description 6 / 8

(après chute des feuilles)

Année: 2006

Observateur:

Code cépage :

Code introduction: 8500Mtp31

Nom introduction : Lambrusque Sejnene 1

Emplacement: Vass2R08s301-305

Sarment

oiv 101 section transversale : circulaire 1 - elliptique (3)- aplatie 5.

oiv 102 surface : unie 1 - côtelée 2 - striée 3.

oiv 103 couleur générale : jaune 1 - brunâtre 2 - rouge violacé 3 - gris 4.

oiv 104 lenticelles : absentes P- présentes 9.

oiv 105 densité des poils dressés des nœuds : absence P- présence 9.

oiv 106 densité des poils dressés des entrenœuds : absence ① - présence 9.

oiv 351 vigueur * : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte \mathcal{T} - très forte 9.

oiv 352 croissance prompts-bourgeons: très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte D- très forte 9.

oiv 353 longueur entrenoeuds: très courts (<60mm) 1 - courts (90mm) 3 - moyens (120mm) 5 -

longs (150mm) 7- très longs (>180mm) 9.

Valeur absolue : 150 -

oiv 354 diamètre entrenoeuds: très petit (<5mm) 1 - petit (8mm) 3 - moyen (11mm) 5-

grand (14mm) 7 - très grand (>17mm) 9.

Valeur absolue: 10

Suppléments pour Porte-greffe

oiv 551 rendement en bois/ha: très faible 1 - faible 3 - moyen 5 - élevé 7 - très élevé 9.

oiv 552 formation de cal de soudure : très faible 1 - faible 3 - moyen 5 - élevé 7 - très élevé 9.

oiv 553 aptitude à la rhizogenèse : très faible 1 - faible 3 - moyen 5 - élevé 7 - très élevé 9.

Vassal:

Noeuds: aplatis 1 - moyens 2 - saillants 3.

Pruine sur sarment : absence 1 - partiellement présente 2 - présente 3.

^{*} voir également le formulaire 1/8 « phénologie et vigueur »